[患部]犬外皮

[パイタル] 10(10)

[手術時間] 5:00:00



一 クルルマ・メタル -

_		WASHING THE RESIDENCE OF THE STATE
1	he patient's Life is in your hands	
6	カウンターショックで心拍を復活させる	ZB
6	1回目の心細動が発生するまで③~⑥の手順を	
1	進める(心細動→P31)	
-		
C	右側に発生している血溜まり×3を吸引	Oct
-	(散弾摘出→P28)	
	(	
0	却と ブルス弾いのた 同切して 弾点の中辺ましい	40.
S	刺さっている弾×3を回収して 弾痕の血溜まり×	100
	3を吸引(散弾摘出→P28)	
-	追加トレイの人工膜を弾痕×3に乗せて人工膜を	10
	まとめて定着させる(弾痕処置→P28)	
0	を側にある血溜まりの左右に発生する出血×2を	*
	治療(出血→P24)	
6	心細動が発生。心停止になった場合はカウンタ	Z 8
	ーショックで心拍を復活させる(心細動→P31)	
-		
-	次の心細動が発生するまでに①~③の手順を進	
-	める(心細動→P31)	
-	wy-3 (-С-лицэм) - 1 31 /	
-	中央にある血溜まり×2のみを吸引	Q <sub>a</sub>
-		16
	(散弾摘出→P28)	
-		
-		10
_	×2を吸引(散弾摘出→P28)	
(	1 刺さっている弾×2を回収し、弾痕の血溜まり×2	00 P
	を吸引( 散弾摘出→P28)	
6	2 追加トレイの人工膜を弾痕×2に乗せて人工膜を	10
	まとめて定着させる(弾痕処置→P28)	
6	3 血溜まりと血溜まりの間に発生する出血を治療	
3	(出血→P24)	

残った血溜まり×2を①~②の手順で処置 (散弾摘出→P28、弾痕処置→P28) 17 右側に発生する出血を治療(出血→P24) 18 心細動が発生。心停止になった場合はカウンタ ーショックで心拍を復活させる(心細動→P31) 19 次の心細動が発生するまでに20~22の手順を進 める(心細動→P31) 20 バイタルを40ぐらいまで回復する (バイタル回復→P23) 21 内出血×4の場所を特定し、患部をまとめて切開 (内出血→P29) 22 内出血の血溜まり×4を吸引し、吸引した順番で 切開口×4を縫合(内出血→P29) 23 カウンターショックで心拍を復活させる ZB (心細動→P31) The patient is saved



開始直後の最大バイタル値 は10だが、カウンターショック 後に心拍が安定すれば最大 で75まで復活させられる。



心拍を復活させると手術終 了 バイタルの回復はできな いので、VITALS BOUNSの 得点は稼げない。

# 

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し			1	1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	120	180	200	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	40	50	60	1.2
カウンターショックの回数○○回以下	12	9	8	1.3

4 心細動が発生。心停止になった場合はカウンタ

ーショックで心拍を復活させる(心細動→P31)

5 次の心細動が発生するまでに10~10の手順を進

### OPERATION BANK

.

ランク	Easy	Normal	Hard
С	0 ~ 2699	0 ~ 3399	0~4799
В	2700 ~ 2799	3400 ~ 3799	4800 ~ 5099
A	2800 ~ 2999	3800 ~ 4099	5100 ~ 5399
S	3000 ~	4100 ~	5400 ~ 5599
XS	_	-	5600 ~





[患部]火傷外膚

[バイタル] 10(10)

[手術時間] 10:00:00

カウンターショックでバイタル の上限が65まで増える。安

全に進めるなら次の手順に

進むまえに回復しておこう。

移植用皮膚は、8枚分をまと

めて作るといい。配置場所

を間違えやすければ左下も切 て9枚作ろう。

The

## ○ 患者のバイタル値と連続執刀クリア目標タイム

- ◇1人目/火傷皮膚/10(10)/残り7:54:00(2分6秒で処置)
- ◇2人目/小腸/45(65)/残り6:43:00(1分11秒で処置)
- ◇3人目/左肺/55(80)/残り5:10:00(1分33秒で処置)
- ◇4人目/脾臓、肋骨/30(65)/残り3:51:00(1分19秒で処置)
- ◇5人目/心臓/50(65)/残り3:14:00(1分37秒で処置)

重度の火傷(黒く変色した火傷)は移植皮膚を

火傷の血溜まりを吸引し、移植皮膚を火傷部分

がイタルが低下したら回復(バイタル回復→P23)

6 2~5を繰り返し、胸部にある火傷を処置(移植 皮膚→P32、火傷→P32、重度の火傷→P32) 術野を下に移動させ 腹部にある火傷を2~5

の手順で処置(移植皮膚→P32、火傷→P32、

右図(血溜まり発生位置)の血溜まり(0、0)、(0)

追加トレイの人工膜を弾痕に乗せて定着させる

□ 3、5の手順で右図(血溜まり発生位置1)の血

1 右図(血溜まり発生位置1)の血溜まり<a>⑥、</a>。

吸引し、弾痕を切開する(散弾除去→P28)

2 切開した弾痕の血溜まりを吸引し、弾を回収

13 3、3の手順で弾痕の血溜まりを処置 ( 弾痕処置→P28)

14 腹部を消毒して切開(切開→P24)

溜まりの、③、⑤の血溜まりを処置

重度の火傷→P32)

を吸引(弾痕処置→P28)

(弾痕処置→P28)

(弾痕処置→P28)

(散弾除去→P28)

8 2人目の患者

乗せるまえに除去する(重度の火傷→P32)

に4枚乗せて定着させる(火傷→P32)

	THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	A COLUMN TO A COLU	·Sldp·
he patient's Life is in your hands			Time Limit
		150	0.915.012.1 Score
1人目の患者		11000	R. San Moor
カウンターショックで心拍を復活させ、バイタルを		01 01	
回復(バイタル回復→P23)			1900
		200	
培養液(黄色の液体)を患者の右上半身に投与	11	移植用皮膚は、 数枚用意してお	あらかじめ きましょう。
し、移植用皮膚を切り取る(移植皮膚→P32)		**	Skip

0

Ox 1

初期段階から黒く変色してい る皮膚がいくつかあるが、火 傷を一定時間放置した場合 も黒く変色した皮膚になる。



黒く変色した皮膚の上に血 溜まりが発生した場合、先に 血溜まりを吸引しないと切り 離せないので注意したい。



血溜まりを吸引しても、すぐに また血溜まりが再発すること もある。移植皮膚は素早く4 枚乗せて定着させたい。

## ■ 血溜まり発生位置 1



左図の記号は、チャート表の番号 と対応しており、△~□の血溜ま りの下には弾痕が、⑥と⑪の下 には散弾が埋まっている。

3 Operation Guide